Introduction à la Météorologie SCA2611

Table des matières

14. Le Climat

- Le climat d'aujourd'hui
- Le climat passé
- Le climat : un système dynamique
- Les modèles climatiques
- Le climat future
- La variabilité climatique
 - i. L'irradiance solaire
 - ii. Les paramètres orbitaux de la Terre
 - iii. Les éruptions de volcans
 - iv. La circulation océanique
 - v. La concentration de CO_2 dans l'atmosphère

- La **climatologie** réfère aux conditions météorologiques **moyennes** en un lieu donné soit pour une année, une saison, ou une journée.

Les éléments plus importants descriptifs du climat sont :

- La température de l'air
- L'humidité de l'air
- Les types de nuages et la nébulosité
- Les types de précipitations et la pluviométrie
- La pression
- La vitesse et la direction du vent

Température de l'air : Janvier

Air Temperature

Jan

-50 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35°C

Température de l'air : Juillet

Air Temperature

Jul

Température de l'air : Moyenne annuelle

Faites votre propre carte : <http://www.cdc.noaa.gov/>

lon: plotted from 0.00 to 357.50
lat: plotted from -90 to 90.00
t: averaged over Jan 1959 to Dec 1997
lev: 0

Mean air degC

Données : NCEP/NCAR Reanalysis Project

MAX=29.372
MIN=-49.9137

GrADS image

Humidité spécifique : Moyenne annuelle

lon: plotted from 0.00 to 358.13
lat: plotted from -88.54 to 88.54
t: averaged over Jan 1959 to Dec 1997
lev: 0

Mean shum grams/kg

Données : NCEP/NCAR Reanalysis Project

MAX=19.4588
MIN=0.118622

GrADS image

Les précipitations : Janvier

Les précipitations : Juillet

Les précipitations : Année

Précipitation

Moyenne climatologique de la précipitation en cm en janvier (en haut) et en juillet (en bas). Wallace et Hobbs, 2006.

Classification de Köppen

Wladimir Peter Köppen a mis au point dans les années 1920 un système de classification des climats, basée uniquement sur les précipitations et les températures. Un climat est ainsi repéré par un code de deux ou trois lettres :

1^e lettre : type de climat

Code	Type	Description
A	Climat tropical	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Température moyenne de chaque mois de l'année > 18°C ▪ Pas de saison hivernale ▪ Fortes précipitations annuelles (supérieure à l'évaporation annuelle)
B	Climat sec	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Évaporation annuelle supérieure aux précipitations annuelles ▪ Aucun cours d'eau permanent
C	Climat tempéré chaud	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Températures moyennes des 3 mois les plus froids comprises entre -3°C et 18°C ▪ Température moyenne du mois le plus chaud > 10°C ▪ Les saisons été et hiver sont bien définis
D	Climat tempéré froid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Température moyenne du mois le plus froid < -3°C ▪ Température moyenne du mois le plus chaud > 10°C ▪ Les saisons été et hiver sont bien définis
E	Climat polaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Température moyenne du mois le plus chaud < 10°C ▪ La saison d'été est très peu marquée

Classification de Köppen

2^e lettre : régime pluviométrique

Code	Description	S'applique à
S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Climat de steppe ▪ Précipitations annuelles comprises entre 380 et 760 mm 	B
W	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Climat désertique ▪ Précipitations annuelles < 250 mm 	B
f	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Climat humide ▪ Précipitations tous les mois de l'année ▪ Pas de saison sèche 	A-C-D
w	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saison sèche en hiver 	A-C-D
s	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saison sèche en été 	C
m	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Climat de mousson ▪ Précipitations annuelles > 1500 mm ▪ Précipitations du mois le plus sec < 60 mm 	A
T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Température moyenne du mois le plus chaud comprise entre 0 et 10°C 	E
F	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Température moyenne du mois le plus chaud < 0°C 	E
M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Précipitations abondantes ▪ Hiver doux 	E

On obtient donc les catégories suivantes :

- Af : climat tropical humide
- Aw : climat de savane tropicale
- Am : climat de mousson
- BS : climat de steppe
- BW : climat désertique
- Cf : climat tempéré humide sans saison sèche
- Cw : climat tempéré humide avec hiver sec
- Cs : climat tempéré humide avec été sec (climat méditerranéen)
- Df : climat tempéré froid sans saison sèche
- Dw : climat tempéré froid avec hiver sec
- ET : climat de toundra
- EF : climat d'inlandsis
- EM : climat subarctique maritime

Classification de Köppen

3^e lettre : variations de température

Code	Description	S'applique à
a : été chaud	<ul style="list-style-type: none"> Température moyenne du mois le plus chaud > 22°C 	C-D
b : été tempéré	<ul style="list-style-type: none"> Température moyenne du mois le plus chaud < 22°C Températures moyennes des 4 mois les plus chauds > 10°C 	C-D
c : été court et frais	<ul style="list-style-type: none"> Température moyenne du mois le plus chaud < 22°C Températures moyennes mensuelles > 10°C pour moins de 4 mois Température moyenne du mois le plus froid > -38°C 	C-D
d : hiver très froid	<ul style="list-style-type: none"> Température moyenne du mois le plus froid < -38°C 	D
h : sec et chaud	<ul style="list-style-type: none"> Température moyenne annuelle > 18°C 	B
k : sec et frais	<ul style="list-style-type: none"> Température moyenne annuelle < 18°C 	B

Classification de Köppen

A TROPICAL HUMID CLIMATES

- Af Tropical wet climate
- Am Tropical monsoonal climate
- Aw Tropical savanna climate

D SEVERE MIDLATITUDE CLIMATES

- Dfa Humid continental, no dry season
- Dfb Humid continental, no dry season
- Dwa Humid continental, winter-dry
- Dwb Humid continental, winter-dry
- Dfc Subarctic, no dry season
- Dfd Subarctic, no dry season
- Dwc Subarctic, winter-dry
- Dwd Subarctic, winter-dry

B DRY CLIMATES

- BWh Subtropical desert
- BWk Midlatitude desert
- BSh Subtropical steppe
- BSk Midlatitude steppe

E POLAR CLIMATES

- ET Tundra
- EF Ice cap

H HIGHLAND

- H Cold climates due to elevation

C MILD MIDLATITUDE CLIMATES

- Cfa Humid subtropical, no dry season
- Cwa Humid subtropical, winter-dry
- Cwb Humid subtropical, winter-dry
- Cfb Marine west coast, no dry season
- Cfc Marine west coast, no dry season
- Csa Mediterranean summer-dry
- Csb Mediterranean summer-dry

Classification climatique du Québec

Classes selon Litynski

- 1: P/SA/TC
- 4: P/M/TC
- 3: P/M/C
- 2: SpF/M/TC
- 5: SpF/M/C
- 6,7: SpF/SH/C
- 8,9: SpF/SH/M
- 10: Sp/H/C
- 12: Sp/H/M
- 13,15: Sp/SH/M
- 11: SpD/SH/L
- 14: M/SH/L

Température (C) :

- P : polaire (-9,4 à -6,0)
- SpF : subpolaire froide (-9,4 à -6,0)
- Sp : subpolaire (-1,5 à -1,9)
- SpD : subpolaire douce (1,9 à 4,5)
- M : modérée (4,5 à 6,6)

Précipitation (mm)

- SA : semi-aride (250 à 469)
- M : modérée (470 à 799)
- SH : subhumide (800 à 1359)
- H : humide (>1360)

Saison de croissance (jours)

- TC : très courte (90 à 119)
- C : courte (120 à 149)
- M : moyenne (150 à 179)
- L : longue (180 à 209)

La variabilité climatique

Facteurs externes

Irradiance
solaire

Paramètres
astronomiques

Poussières
interstellaires

Émission des
volcans

Chimie de
l'atmosphère

Formation des
montagnes

Réfectivité de
l'atmosphère

Dérive des
continents

Échanges de chaleur
atmosphère/océan

Albédo de
surface

Climat de la
Terre

Facteurs internes

Facteurs dominants

Seulement un nombre limité de facteurs sont les principaux responsables de la variabilité du climat :

- Les variations de l'irradiance solaire
- Les variations des paramètres orbitaux de la Terre
- Les éruptions de volcans
- La circulation océanique
- Les variations de la concentration de CO_2 dans l'atmosphère

L'irradiance solaire

Irradiance solaire

DAILY SUNSPOT AREA AVERAGED OVER INDIVIDUAL SOLAR ROTATIONS

<http://solarscience.msfc.nasa.gov/>

Approx. size of Earth → •

Le petit âge glacière

La chronologie des oscillations du petit âge glaciaire varie selon les études, mais toutes s'accordent sur une baisse générale de la température moyenne d'environ 1550 à 1850.

400 Years of Sunspot Observations

Sports sur une rivière glacé, environ 1660
 Aert van der Neer (Hollande, 1603/4-1677)
 Huile sur bois; 9 1/8 x 13 3/4 in. (23.2 x 34.9 cm)
 Collection Friedsam, don de Michael Friedsam, 1931
 (32.100.11)

Les paramètres orbitaux de la Terre

L'excentricité

<http://www.inrp.fr/Acces/biotic/environ/paleoclimats/html/milanko1.htm>

- L'analyse de l'excentricité montre une périodicité au alentour de ~ 100 kyr.

L'obliquité

Obliquité : ε

Maximum = $24,5^\circ$
Minimum = $21,9^\circ$
Valeur actuelle = $23,439^\circ$

Obliquité (en $^\circ$)

Puissance spectrale
(unité arbitraire)

- Elle est actuellement de $23^\circ 27'$.
- L'analyse de l'obliquité montre une périodicité voisine de 41 kyr.

La précession

QuickTime™ and a
GIF decompressor
are needed to see this picture.

- L'axe reprend la "même position" environs tous les 26 kyr.

La précession

- La précession est modulée par l'excentricité et l'analyse montre une périodicité située essentiellement autour de 19, et 23 kyr.

Excentricité, obliquité et précession

- Les périodicités du ETP sont autour de 19, 23, 41, et 100 kyr.

Variation du volume de glace

- Les périodicités du volume de glace sont autour de 19, 23, 41 et 100 kyr aussi.

Théorie de Milankovitch

Théorie de Milankovitch

Période glaciaire

Excentricité faible
Inclinaison faible
Grande distance Terre-Soleil en été

--> configuration orbitale favorisant une glaciation
--> faible contraste entre les saisons

Période inter-glaciaire

Excentricité forte
Inclinaison forte
Faible distance Terre-Soleil en été

--> configuration orbitale favorisant une déglaciation
--> saisons contrastées (étés plus chauds, hivers plus froids)

Dernier age glaciaire

Étendu du couvert de glace sur les continents de l'hémisphère nord il y a 20000 ans (gauche) au maximum du dernier age glaciaire en comparaison à l'étendu actuel (droite). Tiré de Wallace et Hobbs, 2006.

Les éruptions de volcans

Mont Pinatubo, Philippines, le 15 juin 1991

Mont Pinatubo, panache de SO_2

Mont Pinatubo, masse d'aérosols

SAGE II 1020 nm Optical Depth

91-April-10 to 91-May-13

91-June-15 to 91-July-25

91-August-23 to 91-September-30

93-December-5 to 94-January-16

Anomalies de la température

Global Tropospheric Temperature Anomalies
Jan. 1979 - May 2000

El Chichon

Pinatubo

La circulation océanique

Température de l'eau : Moyenne annuelle

lon: plotted from 0.50 to 359.50
lat: plotted from -89.5 to 89.5
t: averaged over Jan 1960 to Dec 2005
lev: 0

Mean sst degC

MAX=29.5729
MIN=-1.85001

GrADS image

Température de l'eau : Anomalie

lon: plotted from 0.50 to 359.50
lat: plotted from -89.5 to 89.50
t: averaged over Jan 1960 to Dec 2005
lev: 0
Mean Eddy sst degC

MAX=11.4727
MIN=-8.29832

GrADS image

SYR - FIGURE 4-2

Circulation thermohaline

QuickTime™ and a
Cinepak decompressor
are needed to see this picture.

Anomalie saisonnière de la SST

OCEAN TEMPERATURES (°C)

EL NIÑO
Jan-Mar 1998

LA NIÑA
Jan-Mar 1989

OCEAN TEMPERATURE DEPARTURES (°C)

El Niño - La Niña

WARM EPISODE RELATIONSHIPS DECEMBER - FEBRUARY

COLD EPISODE RELATIONSHIPS DECEMBER - FEBRUARY

WARM EPISODE RELATIONSHIPS JUNE - AUGUST

COLD EPISODE RELATIONSHIPS JUNE - AUGUST

Recent Evolution of Equatorial Pacific SST Departures (°C)

SST departures switched to positive during April/May 2006.

Between May 2006 and December 2006, positive SST anomalies increased across the equatorial Pacific between 160°E and the South American coast.

In late December 2006-early January 2007 SST anomalies decreased in most areas east of the Date Line.

ONI (°C): Evolution since 1950

The most recent ONI value (October-December 2006) is 1.1°C.

La concentration de CO_2 dans
l'atmosphère

Un changement climatique à court terme?

Température globale - Concentration CO_2

Source: J.R. Peill, J. Jouzel, et al. Climate and atmospheric history of the past 420 000 years from the Vostok ice core in Antarctica, Nature 399 (3JUne), pp 429-436, 1999.

Mesures indirectes de température

Plusieurs techniques sont utilisées pour mesurer le climat du passé :

- Examen des échantillons de fossiles et de pollens
- Extraction d'échantillons de glace profonde des glaciers et des calottes polaires
- Examen des anneaux de croissance des arbres

Toutes ces méthodes donnent des indices sur la température, la précipitation et la rose de vents aussi bien que sur la composition chimique de l'atmosphère du passé.

Cycle du carbone

Fast and slow processes in the carbon cycle

SYR - FIGURE 5-4

Sources primaires de CO₂

Fig. 2.24 Rate of carbon uptake by photosynthesis, commonly referred to as net primary productivity, averaged over June 2002, in units of kg/m²/yr. Values are low over high latitudes of the southern hemisphere because of the lack of sunlight. [Based on NASA SeaWiFS imagery.]

Emission anthropique de CO_2

CO_2 Emissions from Fossil Fuels and Land Use Change

Les océans, puits de CO₂

Dissolved Inorganic Carbon (μmol/kg) along 170°W

Ecosystem model

Salinity (CTD) along 170°W

Tendance du CO₂

Mauna Loa Monthly Mean Carbon Dioxide

Atmospheric carbon dioxide monthly mean mixing ratios. Data prior to May 1974 are from the Scripps Institution of Oceanography (SIO, blue), data since May 1974 are from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, red). A long-term trend curve is fitted to the monthly mean values. Principal investigators: Dr. Pieter Tans, NOAA CMDL Carbon Cycle Greenhouse Gases, Boulder, Colorado, (303) 497-6678, pieter.tans@noaa.gov, and Dr. Charles D. Keeling, SIO, La Jolla, California, (616) 534-6001, cdkeeling@ucsd.edu.

RECENT GLOBAL MONTHLY MEAN CO₂

- Le cycle annuel est dû au caractère saisonnier de la végétation.
- Pour les latitudes arctiques, l'amplitude du cycle peut atteindre les 15 ppmv.

Évolution de la température

Variations of the Earth's surface temperature for...

La température au Canada

Figure 3
Tendance de la température annuelle
au Canada, 1895–1992

Source : Environnement Canada.

Les derniers 500 million d'année

Indice de temps extrême

- Température maximale et minimale du mois
- Précipitation journalière
- Indice mensuel de sécheresse
- Vitesse du vent des cyclones tropicaux et des ouragans sur les terres

- Peut-être étions-nous "gâtés" par un climat anormalement régulier pendant les derniers 40 ans?
- Est-ce que nos modèles numériques sont assez justes et précis pour prévoir la variabilité du climat du futur?

Comparison between modeled and observations of temperature rise since the year 1860

SYR - FIGURE 2-4